

# Allergie huidpriktest bij kinderen

## Inleiding

Uw kind is doorverwezen voor een huidpriktest. In deze folder leest u meer over de test, de reden van de test en hoe u uw kind kunt voorbereiden.

Met een allergie huidpriktest onderzoeken we of uw kind aanleg heeft voor een allergie.

## Vorbereiding thuis

Kort voor de test mag uw kind een aantal medicijnen niet gebruiken. Dit is erg belangrijk voor het slagen van de test. Hieronder ziet u om welke medicijnen het gaat.

**1. Antihistaminica** (allergie tabletten/ drank) 3 dagen voorafgaand aan de test stoppen, bijvoorbeeld:

- Aeries (= desloratidine)
- Xyzal (= levocetirizine)
- Zyrtec, Reactine (= cetirizine)
- Telfast (=Fexofenadine)
- Allerfree, Claritine (= loratadine)
- Tavegil (= clemastine)
- Fenistil (= dimetindeen)

**2. Lokale corticosteroïd zalven en crèmes** indien mogelijk 1 week (minimaal 3 dagen) voorafgaand aan de test niet meer smeren op de onderarmen. Dit is namelijk het testgebied. Voorbeelden van corticosteroïd zalven en crèmes zijn:

- Hydrocortison
- Emovate
- Triamcinolon
- Cutivate
- Mometason
- Betnelan

Als uw kind andere medicatie gebruikt, overleg met uw behandelaar of deze medicatie gestopt moet worden of normaal gebruikt mag worden.

Als uw kind op de dag van de test ziek is en/of koorts heeft, of als er sprake is van actief eczeem op de onderarmen, wordt de test uitgesteld.

### **De Test**

De test kan worden afgenomen door een verpleegkundige of polikliniekassistente. Ouder(s)/ verzorger(s) mogen hierbij aanwezig zijn.

Op de onderarm worden een aantal druppeltjes, met daarin opgelost verschillende (verdachte) stoffen, geplaatst. Daarnaast worden 2 controledruppels aangebracht. Vervolgens worden deze druppeltjes met een lancetje (prikker) doorgeprikt tot net in de huid. De ene controledruppel bevat histamine en hoort altijd een (milde) reactie te geven. De andere controledruppel laat geen reactie zien. Dit laat zien dat de test correct is uitgevoerd.

Na ongeveer 15 minuten is zichtbaar voor welke stoffen uw kind mogelijk allergisch is. Dat is te zien aan een wit bultje dat een beetje jeukt. Het bultje lijkt op een muggenbult. Als zo'n bultje zichtbaar is, dan wordt de grootte van de zwelling gemeten en genoteerd.

Na de test kan uw kind gewoon naar huis of school. Uw kind mag de eigen medicijnen weer gebruiken zoals altijd.

### **Duur van de test**

Het test duurt inclusief de wachttijd ongeveer 30 minuten.

### **De uitslag**

De uitslag van de test en de daarbij behorende adviezen bespreekt -soms aansluitend - de verpleegkundig specialist of arts met u.

### **Verhinderd**

Mocht uw kind om wat voor reden ook verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek Kind & Jeugd.

### **Tot slot**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Kind & Jeugd.

## Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Kind & Jeugd  
Locatie Deurne  
T: 0493 – 32 89 15  
Locatie Helmond  
T: 0492 – 59 59 55

**Locatie Helmond**  
Wesselmanlaan 25  
5707 HA Helmond  
T: 0492 – 59 55 55

**Locatie Deurne**  
Dunantweg 16  
5751 CB Deurne  
T: 0493 – 32 88 88

**Locatie Gemert**  
Julianastraat 2  
5421 DB Gemert  
T: 0492 – 59 55 55

